



Beste mensen,

Wij (Jaap en Stef) doen een afstudeeronderzoek naar de Marnewaard als foerageergebied voor de grauwe kiekendief. Eén van de onderdelen is het bepalen van het jaagsucces van de grauwe kiekendief (maar ook bruine kiekendief, blauwe kiekendief, steppekiekendief, torenvalk en velduil).

In de Marnewaard lukt het ons om voldoende protocollen te verzamelen voor een goede indicatie van het jaagsucces. Echter is dit niet haalbaar in ons andere onderzoeksgebied in omgeving Finsterwolde. Graag vragen wij aan jullie om ons te helpen met het verzamelen van jaagprotocollen. Hoeft niet per se in deze omgeving te zijn. Zeer nuttig zijn jagende vogels boven vogelakkers maar elders is ook bruikbaar, zolang het om de eerdergenoemde soorten gaat. Naar eigen ervaring is het erg leuk en ontspannend om de vogels te observeren. Door één vogel langdurig te volgen, kom je er nogmaals achter hoe mooi ze eigenlijk zijn! Wij zouden jullie inzet erg waarderen. Deze oproep geldt voor de maand juli.

Werkwijze

Een jaagprotocol start als een roofvogel jagend wordt gesignaleerd. Het protocol kan bij een jagende vogel direct starten en bij een zittende vogel zodra deze opvliegt. Het protocol stopt zodra een vogel gedurende vijf minuten geen jaaggedrag meer vertoont, een succesvolle stoot heeft verricht, de vogel uit het gezichtsveld verdwijnt of na tien minuten jaagtijd. Als de tijdslimiet bereikt is, wordt een nieuw protocol voor dezelfde jagende vogel gestart. Wij werken de protocollen verder zelf uit, deze kunnen opgestuurd worden naar stef.kooijman@hvhl.nl

Een korte handleiding kun je [hier](#) vinden.

Vriendelijke groeten,
Jaap van Dorst en Stef Kooijman



©Gerhard Kornelis

